
Imagens em Gastreenterologia e Hepatologia / Images in Gastroenterology and Hepatology

LINFOMATOSE CÓLICA

C. BRANDÃO¹, N. FERNANDES¹, L.MOREIRA DIAS¹

GE - J Port Gastreenterol 2007:76

A linfomatose cólica difusa, sob a forma de polipose, é uma forma rara de expressão das doenças linfoproliferativa, nomeadamente de linfomas de células do manto.

Apresenta-se um caso clínico de um doente de 80 anos, sexo masculino, com diagnóstico de linfoma de células do manto ganglionar em remissão completa após tratamento com quimiorradioterapia. Cerca de dois anos após o tratamento verificou-se recidiva ganglionar e aparecimento de tenesmo e diarreia aquosa, sem sangue, muco ou pús. Foi submetido a colonoscopia total que revelou ulceração superficial no recto e múltiplas formações polipoides ao longo de todo o cólon, sésseis, com dimensões entre os 2 e os 15 mm, algumas de aspecto submucoso e algumas ulceradas (Figura 1). No cólon ascendente (Figura 2) e na válvula ileo-cecal (Figura 3) observaram-se ainda duas lesões polipoides sésseis



Figura 1 - Ao longo de todo o cólon observam-se múltiplas formações polipoides, sésseis, com dimensões entre os 2 e os 15 mm, algumas de aspecto submucoso e algumas ulceradas.



Figura 2 - No cólon ascendente observa-se lesão polipoide sésseil, ulcerada, com cerca de 25 mm.

ulceradas e irregulares, com cerca de 25 mm e 30 mm, respectivamente. A histologia revelou mucosa cólica com envolvimento por neoplasia maligna com características de linfoma Não-Hodgkin, de células do manto, compatível com polipose linfomatosa cólica.

Foi proposto para RT paliativa rectal pela persistência das queixas de tenesmo, tendo o doente falecido cerca de 3 anos depois.



Figura 3 - Ao nível da válvula ileocecal observa-se lesão polipoide sésseil, ulcerada, com cerca de 30 mm.